

| KOD | YAYIN TARİHİ | REVİZYON TARİHİ | REVİZYON NO | SAYFA NO |
|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| HB.RB.62 | 01.01.2017 | ---- | 0 | Sayfa 1 / 1 |

Hasta Adı Soyadı**Tarih****İŞLEM HAKKINDA BİLGİ**

Genel Bilgilendirme;

Apandisit karın içerisinde sağ alt bölgede yerleşmiş ince ve kalın bağırsakların bileşkesinde yer alan kör bağırsak kesesinin iltihaplanmasıdır. Tek bilinen tedavisi ameliyattır. Genel anestezi altında karın ön duvarı açılarak operasyon ile iltihaplanmış organ (apandisit) çıkarılacaktır. Delinmiş (patlamış) apandisit ameliyattan önce veya ameliyat sırasında saptanması daha geniş çaplı operasyon ve bazen daha uzun süre hastanede yatışı gerektirebilir.

Genel Komplikasyonlar;

- Genel anestezi (Narkoz) alan hastalarda artmış akciğer enfeksiyonu riski, akciğerin belli bölgelerinde sönmeler, çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
- Özellikle uzun süre hareketsiz kalan hastalarda, şişmanlık problemi olanlar ve kanın pıhtılaşma şansını arttıran ilaç kullananlarda ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir.
- Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi, merkez sinir sistemi ile ilgili sorunlar ve felç.
- İşlemden kaynaklanabilen ölüm.
- Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma.
- Sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma.
- Şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi önceden bilinen sistemik hastalığı olan hastalarda bu problemlere bağlı oluşabilecek ataklar ve problemler

ALTERNATİF TEDAVİLER

Günümüzde apandisit cerrahi tedavisi laparoskopik (kapalı) ameliyatlara da yapılabilmektedir.

İŞLEME AİT KOMPLİKASYONLAR

Ameliyat sırasında karın içinde veya kaslar ile cilt bölgesinde kanama olabilir ve kan birikimine bağlı hematoma denilen kan pıhtısının toplanması gelişebilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine has komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.

Ameliyat sonrası karın içinde ve/veya yarada iltihap gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilir.

Ameliyatta karın içi organlar ve damarlarda yaralanmalar olabilir ve bu yaralanmalar için aynı seans veya sonraki bir müdahale ile ek operasyonlar gerekmekle birlikte hayati tehlike taşıyabilir.

Operasyon sırasında saptanabilecek ek sorunlar için hastanın yarar görmesi ve operasyon riskini çok arttırmaması durumunda bu sorunlara yönelik de cerrahi müdahale gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda genellikle operasyon esnasında hasta yakınlarına bilgi verilmektedir.

Bağırsak yaralanmaları veya apandisit operasyon yerindeki açılmalar durumunda bazen kolostomi işlemi (geçici olarak bağırsağın karın cildi ile birleştirilmesi ve büyük tuvaletini torbaya yapması) gerekli olabilir.

Delinmiş apandisit ve yaygın karın zarlari iltihaplanmasında dren konması, yıkamaların tekrarlanması ve

| | | | | |
|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| KOD | YAYIN TARİHİ | REVİZYON TARİHİ | REVİZYON NO | SAYFA NO |
| HB.RB.62 | 01.01.2017 | ---- | 0 | Sayfa 2 / 1 |

tekrar operasyonlar gerekebilir.

Ameliyattaki gecikme, tanı anındaki enfeksiyonun yayılmış olması ve/veya ameliyattan sonra gelişen komplikasyonlara bağlı hayat kaybı söz konusu olabilir.

Operasyon izinde kozmetik olarak görüntü sorunları, operasyon yerinde yeni bir operasyon gerektiren fitiklaşma ve ameliyat bölgesinde kronik ağrılar oluşabilmektedir.

Hasta,veli veya vasinin onam açıklaması:

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
- Tedavi/girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Tedavi/ girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
- İstemediğim takdir de tedavi ve girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi, tedavi kararından vazgeçebileceğimi biliyorum.
- Yapılacak ameliyat sırasında sağlığım için gerekli görülmesi halinde kan ve kan ürünlerinin nakline de bu belge ile izin veriyorum.

Yukarıda sayılan tehlike ve riskleri biliyor ve bana önerilen ameliyatı bilinçli olarak kabul ediyorum.

Not: Lütfen el yazınızla " 2 sayfadan oluşan bu onamı okudum , anladım ve kabul ediyorum" yazınız ve imzalayınız.....

.....

| | Adı – Soyadı | İmza | Tarih /Saat |
|--|--------------|------|-------------|
| Hasta / Hastanın Yakını Yasal Temsilcisi(*) | | | |
| Hastanın Yakını-Yakınlık Derecesi: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne - baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar | | | |
| Hastanın Yasal Temsilcisinden Rıza Alınma Nedeni: | | | |
| <input type="checkbox"/> Hastanın bilinci kapalı <input type="checkbox"/> Hasta 18 yaşından küçük <input type="checkbox"/> Hastanın karar verme yetisi yok <input type="checkbox"/> Acil | | | |
| | Adı – Soyadı | İmza | Tarih |
| /Saat | | | |
| Bilgilendirmeyi yapan Hekim | | | |
| Tanık | | | |
| Tercüman (kullanılması halinde) | | | |