

KOD	YAYIN TARİHİ	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON NO	SAYFA NO
SİY.LS.24	01.01.2017	----	0	Sayfa 1

KULLANILAN İLAÇ	TİCARİ İSMİ	ETKİLEŞİMİ OLAN	ÖNLEMLER
ACE İNHİBİTÖRLERİ			
KAPTOPRİL, RAMİPRİL, ENALAPRİL, FİSİNOPRİL, LİSİNOPRİL, KİNAPRİL, BENAZEPRİL, SİLAZAPRİL, PERİNDOPRİL, TRANDOLAPRİL	Kapril, Kaptopril, Enalap, Enapril, Konveril, Renitec, Vasolapril, Acerilin, Rilace, Zestril, Sinopryl, Zestoretic, Sinoretic, Acuitel, Coversyl, Preterax, Delix, Monopril, Cibacen, Cibadrex, İnhibace, Tarka, Gopten	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turunçgiller, patates)	Birlikte kullanılmamalıdır.
ANTİASİTLER ALÜMİNYUM İÇERENLER	Kompensan, Gaviscon, Mucaine, Talcid, Dank	Portakal suyu	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
ANTİBİYOTİKLER			
PENİSİLİN ORAL	Cliacil, Penos, Alfoxil, Penbak, Augmentin, Duobaktam, Ampisina, Amoklavin	Asitli besinler (turunçgiller, rafine edilmiş soslar - ketçap, mayonez, hardal-gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları	Birlikte kullanılmamalıdır.
ERİTROMİSİN	Erimicin, Eritro, Eritrosif, Eriyocin	Asitli besinler (turunçgiller, rafine edilmiş soslar - ketçap, mayonez, hardal-gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları	Birlikte kullanılmamalıdır.
SİPROFLOKSASİN	Ciprasid, Cipro, Ciproktan, Loxasid, Proxacin, Roflazin, Roxin, Sanset, Sifloks, Siprobek, Siprosan	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
TETRASİKLİNLER	Tetra, Tetralet	Kalsiyum (süt ve süt ürünleri demir (tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
ANTİİNFLAMA TUVAR			
SULFASALAZİN	Salazopyrin	Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek)	Birlikte kullanılmamalıdır.
ASETİLSALİSİLİK ASİT	Aspirin	C vitamini, Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek), Demir (tüm ^A kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Etki azalması.
ANTİFUNGAL İLAÇLAR	Triflucan	Süt, yoğurt, alkol	Etki azalması.
ANTİKANSER İLAÇLAR			
ETOPOZİT, MERKAPTOPURİN, BUSULFAN,	Vepesid, Puri-nethol, Myleran, Estracyt, Xeloda, UFT, >	Greyfurt	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Birimi	Kalite Yönetim Direktörü	Mesul Müdür

KOD	YAYIN TARİHİ	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON NO	SAYFA NO
SİY.LS.24	01.01.2017	----	0	Sayfa 2
ESTRAMUSTİN, KEPESİTABİN, FLUOROUROSİL, TEMOZOLAMİD, HİDROKSİKARBAMİD, İMATİNİB, TRETİNOİN, TALİDOMİT, TACROLİMUS	Temodal, Hydrea, Glivec, Vesanoïd, Thalidomide, Prograf			kullanılmalıdır.
ANTİKOAGÜLANLAR				
VARFAİN	Coumadin, Orfarin		1. K vitaminden zengin besinler (yeşil sebzeler, yonja, ıspanak, kurubaklagiller, balık) 2. E vitamini (yeşil yapraklı bitkiler, yağlı tohumlar, tahıl taneleri, kuru baklagiller) 3. 1 litreden fazla dondurma	1. Tüketimi sınırlandırılmalıdır. 2. Birlikte kullanılmamalıdır. 3. Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
ANTİKONVÜLZANLAR FENİTOİN, FENOBARBİTAL	Epdantoin, Epanutin		K vitaminleri (ısırgan, balık, kabak, karnabahar, karaciğer), D vitaminleri (balıkyağı, süt, tereyağ)	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
VALPROİK ASİT	Convulex		Karnitin (kırmızı et)	Birlikte kullanılmamalıdır.
BENZODİAZEPİNLER				
MİDAZOLAM, DİAZEPAM, ALPRAZOLAM, KLORDİAZEPOKSİT, LORAZEPAM	Dormicum, Diazem, Lizan, Nervium, Apo-Alpraz, Xanax, Libkol, Librax, Klipaks, Ativan		Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmamalıdır.
BRONKODİLA TÖRLER				
TEOFİLİN	Bronkolin, Talotren, Teobag, Teokap, Theo-dur		Çay, kahve, çikolata gibi teofilin içeren besinler	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
TERFENADİN			Greyfurt	Birlikte kullanılmamalıdır.
Ca KANAL BLOKERLERİ FELODİPİNE, NİFEDİPİNE, NİMODİPİNE, NİSOLDİPİNE, NİTRENDİPİN, VERAPAMİL, AMLODİPİN, DİLTİAZEM	Plendil, Adalat, Kardilat, Nidicard, Nidilat, Nimotop, Syscor, Isoptin, Veroptin, Fibrocard, Tarka, Amiodis, Amiocard, Amiovas, Diloptin, Monovas, Nipidol, Norlopin, Norvadin, Norvasc, Vasocard, Vazkor, Ahizem, Dilcor, Dilticard, Diltizem, Baypres, Nitrensin		Greyfurt suyu, meyan kökü	Birlikte kullanılmamalıdır.
DEMİR PREPARATLARI	Ferrosanol Duodenal, Ferrum Fort, Ferplex, Maltofer, Gyno, Ferrosanol		Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
DIURETİKLER TRİAMTEREN,	Triamteril, Moduretic,		Potasyumca zengin Besinler (muz, kayısı,	Birlikte kullanılmamalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Birimi	Kalite Yönetim Direktörü	Mesul Müdür

KOD	YAYIN TARİHİ	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON NO	SAYFA NO
SİY.LS.24	01.01.2017	----	0	Sayfa 3

AMİLORİDE, SPİRONOLAKTON	Aldactazide, Aldactone	turuncgiller, patates)	
KARDİYAKGLİKOZİTLER DİĞİTOKSİN	Digitoksin	Meyan Kökü	Kesinlikle kullanılmamalıdır.
KORTİZONLU İLAÇLAR	Dekort, Prednol, Prednisolon, Deltacortil	Tuz, şeker, süt, yoğurt, peynir	Birlikte kullanılmamalıdır.
ATORVASTATİN, SİMVASTATİN, FLUVAST ATİN, PRAVASTATİN, SERİVASTATİN	Ator, Lipitor, Lipovas, Zocor, Zovatin, Lescol, Provachol, Lipobay	Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmamalıdır.
TİROİD İLAÇLARI			
TROİD HORMON	Levotiron, Tefor	Soya fasülyesi, şalgam, lahana	Salgıyı inhibe eder.
VİTAMİNLER C VİTAMİNİ	Eser-vit, Redoxon, Vitabiol-C	Süt	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Birimi	Kalite Yönetim Direktörü	Mesul Müdür